

## Wat?

Nastaar of secundair cataract is **een vertroebeling van de achterzijde van de kapselzak waarin zich de implantlens bevindt**. Het is het gevolg van achtergebleven cellen die de achterwand van de kapselzak gaan bedekken en **doet zich vrij frequent voor bij de mensen die geopereerd werden van cataract**. Nastaar kan optreden enkele maanden tot enkele jaren na de operatie.

## Ingreep

Nastaar is **snel, veilig en pijnloos te behandelen door middel van een Yag-laser capsulotomie**. Er wordt een contactlensje op uw oog gezet. U zet uw kin op de kinsteun en plaatst uw hoofd tegen een hoofdband. Hierbij gaat een laserstraal een opening maken in de achterwand van de kapselzak. Deze behandeling duurt een kwartier en **wordt ambulantly uitgevoerd op de raadpleging**.

## Na de ingreep

Direct na de ingreep ziet u niets door de belichting. Het is daarom aangewezen als de behandeling aan beide ogen gebeurt, om **niet zelf met de wagen te komen**. Tevens is het normaal om de eerste dagen na de behandeling kleine bewegende zwarte vlekjes te zien. Dit zijn de kleine verbrijzelde kapselrestjes. Deze nemen geleidelijk aan af. Nemen de

vlekken enorm toe, ontstaan er hevige lichtflitsen of komt er een gordijn geschoven voor uw beeld, dan neemt u contact op met uw oogarts op 051/ 62 04 92.

## Nabehandeling

Na de ingreep dient u **een week druppels in te doen**. Een paar weken na de laseringreep wordt een controle voorzien.